



Xamamina®

REFLUSSO

SCIROPPO ANTIREFLUSSO

Indicazioni

Dispositivo medico destinato ad esercitare un'azione meccanica per il trattamento del reflusso gastroesofageo e/o faringolaringeo, al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali ad esempio: pirosi (bruciore di stomaco), rigurgito acido, tosse, sensazione di globo ipofaringeo, infiammazione faringolaringea, eruttazione, senso di tensione addominale, disfonia (alterazione della voce), e in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il reflusso gastroesofageo e/o faringolaringeo. Coadiuvante i processi di riepitelizzazione della mucosa gastroesofagea e faringolaringea. Riduce il tempo di permanenza del contenuto gastrico nello stomaco. Uso orale.

Composizione

Magnesio alginato, Simeticone, Fruttosio, Gomma Xanthan, Miele, D-pantenolo, Estratti fluidi di Althaea Officinalis e Papaver Rhoeas, Zinco Ossido, Sodio Bicarbonato, Sodio Idrossido, p-Ossibenzoato di Metile Sodico, p-Ossibenzoato di Propile Sodico, Aromi naturali, Eritrosina (E127), Acqua Depurata.

Gusto uva fragola e frutti rossi.

Senza glutine, senza lattosio

Confezioni

Flacone da 500 ml con cucchiaino dosatore.

Astuccio da 25 bustine da 20 ml.

Modalità d'uso Flacone

Agitare energicamente prima dell'uso.

Adulti e bambini sopra i 12 anni: 20 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Modalità d'uso Bustine

Adulti e bambini sopra i 12 anni: 1 bustina da 20 ml dopo i pasti ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Avvertenze

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.
- Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d'uso.
- In caso di reazioni avverse interrompere il trattamento e consultare il medico.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
- È consigliabile interporre un intervallo di almeno un'ora tra l'assunzione del prodotto e quella di farmaci.
- Per l'assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso, senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.
- Per la confezione in flacone si raccomanda di richiudere bene il flacone dopo l'uso.

La presenza di sostanze naturali può incidere sulle caratteristiche organolettiche del prodotto; si possono pertanto rilevare variazioni di colore e/o sapore senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.

Rev. 01/2024

Dompé farmaceutici S.p.A.

Via San Martino, 12

20122 Milano



DMG Italia Srl

Via Laurentina, Km 26,700

00071 - Pomezia (Roma)

Dompé
per l'ambiente



0373



30FG410-A1

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L'USO			
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
FLACONE 500 ML			
Astuccio PAP21 CARTA	Foglietto illustrativo PAP22 CARTA	Flacone PET PLASTICA	Cucchiaino dosatore PS6 PLASTICA
ASTUCCIO 25 BUSTINE			
Astuccio PAP21 CARTA	Foglietto illustrativo PAP22 CARTA	Bustina C/LDPES0 PLASTICA/ALLUMINIO	
Verifica le disposizioni del tuo comune.			